

令和4年度新潟県病害虫発生予察情報・予報第5号

(7月後半の発生予想)

令和4年 7月15日

【作物名】 病害虫名	予報内容 発生量：平年比 発生程度： 発生時期：平年比	予報の根拠
---------------	--------------------------------------	-------

【水稲】

葉いもち	量：少ない 程度：少発生	① 調査ほ場では未確認、発生量は平年比やや少ない。(－) ② BLASTAMによる感染好適条件は、全県的な出現は確認されてない。(－) ③ コシヒカリBLの発病抑制効果は高く維持されている。(－) ④ 向こう1か月の気温は高く、降水量はほぼ平年並、日照時間はほぼ平年並と予想されている。(－～±)
穂いもち	量：やや少ない 程度：少発生 時期：早い	① 7月上旬の葉いもち発生量は平年比やや少ない。(－) ② イネの出穂期は平年より3日程度早まる見込み。 ③ 向こう1か月の気温は高く、降水量、日照時間ともほぼ平年並と予想されている。(－～±)
紋枯病	量：やや多 程度：少発生	① 7月上旬の発生量は平年比多い。(＋) イネの茎数は指標値と比べ、こしいぶきは少ない。コシヒカリと新之助は並。(±～－) ② 向こう1か月の気温は高く、降水量、日照時間ともほぼ平年並と予想されている。(±～＋)
稲こうじ病	量：やや少ない	① 前年の発生量は平年比やや少なく、伝染源量は平年比やや少ないと推定される。(－) ② 向こう1か月の気温は高く、降水量、日照時間ともほぼ平年並と予想されている。(±)
ニカメイチュウ	量：並 程度：少発生 (被害株率1～29%) 時期：やや早い (第1世代発蛾最盛期7月第6半旬頃)	① 7月上旬の被害株率は新潟地域では平年比やや多いが、県全体では平年並。(±) ② 第1世代幼虫の発生時期は平年並。 ③ 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(＋)
セジロウンカ	量：やや少ない 時期：並	① 6月26日に初確認で時期は平年並。(±) ② 7月上旬の発生量は平年比やや少ない。(－) ③ 向こう1か月の気温は平年比高いと予想される。(＋)
ツマグロヨコバイ	量：並 程度：少発生	① 7月上旬の発生量は平年比やや少ない。(－) ② 向こう1か月の気温は平年比高いと予想される。(＋)

【作物名】 病害虫名	予報内容 発生量：平年比 発生程度： 発生時期：平年比	予報の根拠
---------------	--------------------------------------	-------

【水稲】（つづき）

斑点米カメムシ類	量：並 （魚沼地域は多） 時期：やや早い	① 7月上旬の畦畔等雑草地でのすくいとり虫数はアカスジカスミカメは県全体では平年比少ないが、魚沼地域ではやや多い。アカヒゲホソミドリカスミカメは平年比やや少ない。（±～－） ② 水稲の出穂期は平年比3日早い見込み。（＋） ③ 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。（＋）
【防除上の留意事項】 ① 斑点米カメムシ類は出穂したイネ科雑草に寄生し、増殖するので、これらの雑草が出穂する前に畦畔の草刈りを行い、水田侵入前の発生量を抑制する。 ② 水田内雑草（ノビエ、イヌホタルイ等）の繁茂・結実は、カメムシ類の水田侵入・増殖を助長するので早めに除去する。 ③ 品種ごとに出穂期を確認し、防除適期に合わせ確実に薬剤防除する。コシヒカリをはじめとする中生、晩生品種についても適期防除を徹底する。		
イネアオムシ （フタオビコヤガ）	量：並 程度：少発生	① 7月上旬の発生量は平年比やや少ない。（－） ② 向こう1か月の気温は平年比高く、降水量はほぼ平年並と予想されている。（＋～±）
コブノメイガ	量：並 時期：やや早い	① 7月上旬の発生は未確認で発生量は平年並。（±） ② 佐渡市に設置したフェロモントラップでの初誘殺は6月28日で平年（7月2日）比4日早く、誘殺数は概ね平年並。（±）

【大豆】

ウコンノメイガ	量：並 時期：並	① 前年の発生量は平年比少なかった。（－） ② 調査ほ場では7月上旬に少発生が確認され、発生量は平年並。（±） ③ 向こう1か月の気温は高いと予想されている。（＋）
【防除上の留意事項】 ① 幼虫の食害に伴う葉巻の発生は7月中旬頃から始まり、7月第6半旬から急増する。齢期が進んだ幼虫には防除効果が劣りやすいので防除が遅れないよう注意する。 ① 防除時期は7月第6半旬であるが、薬剤によって散布適期が異なるので、新潟県病害虫雑草防除指針に基づき散布する。		
食葉性鱗翅目幼虫 （ウコンノメイガ以外）	量：やや多	① 7月上旬の調査でツメクサガ等の食害が確認され、発生量は平年並。（±） ② 向こう1か月の気温は高いと予想されている。（＋）

～ 防除上の注意事項は、最新の「新潟県農作物病害虫雑草防除指針」を参照してください ～

注1：①「予報内容」の発生量は、予想される発生量が、新潟県における平年の発生量に比べて多
いか少ないかを、少、やや少、並、やや多、多の5段階で表記しています。

②発生程度は、予想される発生量が、国の調査実施基準等で定められている、無発生、少発
生、中発生、多発生、甚発生のいずれに該当するかを表記しています。

注2： 「予報の根拠」の、(+)は発生量を増加させる要因、(-)は発生量を減少させる要因、
(±)はどちらともいえない要因を示しています。

～ 農薬は適正に使用しましょう ～

【新潟県農薬危被害防止運動実施期間：6月1日～8月31日】

- 農薬の準備・使用にあたっては、必ず最新の農薬登録情報を確認しましょう。
- 使用に際しては、ラベルに記載の使用基準や注意事項をよく読み、使用者が責任を持って使
きましょう。
- 農薬の飛散防止に努めましょう。周辺作物や住宅及びミツバチ等への危害防止のため、周辺の
生産者や住民、養蜂業者に事前に防除計画を通知するなどの対策をとりましょう。
- 農薬の使用後は防除日誌や作業日誌等の記帳に努めましょう。
- 水田で湛水して農薬を散布する場合は、処理後7日間の止水を厳守し、落水しないようにしま
しょう。

新潟県病害虫防除所業務課

電 話：0258-35-0867

F A X：0258-35-7445

<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/bojo/>

【参考】北陸地方 1か月予報（7月16日から8月15日までの天候見通し）
 （新潟地方气象台：令和4年7月14日発表）

＜予想される向こう1か月の天候＞

暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は高いでしょう。
 週別の気温は、1週目は、平年並または高い確率ともに40%です。
 2週目は、平年並の確率50%です。
 3～4週目は、高い確率50%です。

＜向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率（%）＞

	低い（少ない）	平年並	高い（多い）
気 温	20	30	50
降 水 量	30	30	40
日照時間	40	30	30

＜気温経過の各階級の確率（%）＞

	低い	平年並	高い
1週目（7月16日～7月22日）	20	40	40
2週目（7月23日～7月29日）	20	50	30
3～4週目（7月30日～8月12日）	20	30	50