

令和2年度新潟県病害虫発生予察情報・予報第6号
(8月の発生予想)

令和2年 8月 3日

<p>【作物名】 病害虫名</p>	<p>予報内容 発生量：平年比 発生程度： 発生時期：平年比</p>	<p>予報の根拠</p>
-----------------------	--	--------------

【水稻】

<p>穂いもち</p>	<p>量：多い 程度：少発生</p>	<p>① 7月下旬の葉いもち発生量は平年比やや多い。一部で多発事例が認められおり、上位葉の病斑も見られる。(+) ② 梅雨明けが遅れ、上位葉への葉いもち進展や、出穂した品種での穂への感染を助長する。(+) ③ 向こう1か月の気温は平年比高く(-)、降水量はほぼ平年並(±)、日照時間はほぼ平年並(±)と予想されている。</p> <p>【防除上の留意事項】 ① ほ場の葉いもち発生状況を確認し、発生程度に応じた防除対応を行う。特に新之助や多肥栽培および転作跡での発生に注意する。 ② 粉・液剤による防除の散布適期は、1回散布では出穂期、2回散布では出穂期直前と穂揃い期である。粒剤は薬剤により散布時期が異なるため、最新の「防除指針」を参照し適期に施用する。</p>
<p>紋枯病</p>	<p>量：多い 程度：少発生</p>	<p>① 7月下旬の発生量は平年比多い。(+) ② 向こう1か月の気温は平年比高く(+)、降水量はほぼ平年並(±)と予想されている。</p>
<p>稲こうじ病</p>	<p>量：多い 程度：少発生</p>	<p>① 前年の発生量は平年並で、伝染源量は平年並と推定される。(±) ② コシヒカリの幼穂形成期以降の降雨日数は、多発生した平成21年並に多い。(+) ③ 8月上旬の気温は平年並(±)、向こう1か月の降水量はほぼ平年並(±)と予想されている。</p> <p>【防除上の留意事項】 ① 発病が確認されたほ場は無発病ほ場と別に収穫し、乾燥・調製も別々に行う。 ② 粗選機を使用して発病粒を除去し、玄米への混入を防ぐ。特にインペラ式粃すり機は発病粒の混入が多い粃には適さないため、必ず粗選機を併用する ③ 調製時には、被害を助長する「肌ずれ」を防止するとともに、流量を調節して丁寧に粃すり・選別を行う。</p>
<p>ニカメイチュウ</p>	<p>量：やや少ない 程度：少発生 (被害株率1~29%) 時期：並 (第1世代発蛾最盛期 8月第1半月頃)</p>	<p>① 7月下旬の被害量はやや少ない。(+) ② 向こう1か月の気温は平年比高く、降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)</p>
<p>セジロウンカ</p>	<p>量：並</p>	<p>① 7月下旬の発生量は平年並。(±) ② 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(+)</p>

【作物名】 病害虫名	予報内容 発生量：平年比 発生程度： 発生時期：平年比	予報の根拠
---------------	--------------------------------------	-------

【水稲】（つづき）

ツマグロヨコバイ	量：並 程度：少発生	① 7月下旬の発生量は平年並。（±） ② 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。（+）
斑点米カメムシ類	量：やや多い 時期：やや早い	① 7月下旬の畦畔雑草地での確認地点率は平年に比べアカスジカスミカメがやや高く、アカヒゲホソミドリカスミカメがやや低い、オオトゲシラホシカメムシがやや低い。（+～±） ② 7月下旬のすくい取り調査では畦畔雑草地、水田内ともに中越、上越地域でクモヘリカメムシ、ホソハリカメムシの確認地点率が平年比高く、確認虫数も多い。（+） ③ イネの出穂期はおおむね平年並と予想されている。（±） ④ 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。（+）
<p>【防除上の留意事項】 ※ 詳細は6月30日発表の注意報第1号を参照</p> <p>① 斑点米カメムシ類の防除実施時期までに畦畔除草を行い、薬剤散布時には雑草が繁茂していない状態を保つ。</p> <p>② コシヒカリの主要加害種であるアカスジカスミカメは畦畔雑草地における発生地点率は平年比やや高いため、コシヒカリをはじめとする中生、晩生品種についても適期防除を徹底する。</p>		
イネツトムシ	量：やや少ない 程度：少発生 (被害株率1～30%)	① 7月下旬の被害量は平年比やや少ない。（-）
イネアオムシ (フタオビコヤガ)	量：やや少ない 程度：少発生 (株当たり最高寄生数 1～10頭)	① 7月下旬の幼虫発生量は平年比やや少ない。（-） ② 向こう1か月の気温は平年比高く、降水量はほぼ平年並と予想されている。（±）
コブノメイガ	量：多い	① フェロモントラップ誘殺数は平年比多い。（+） ② 7月下旬の被害発生は平年比多い。（+）
コバネイナゴ	量：多い 程度：少発生 (株当たり最高寄生数 1～10頭)	① 7月下旬の県内各地域の成幼虫発生量は平年比並～多く、県全体の発生量は平年比多い。（+） ② 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。（+）

【大豆】

紫斑病	量：並	① 前年の紫斑粒の発生は平年並で、伝染源量は平年並と推定される。（±） ② 向こう1か月の降水量はほぼ平年並と予想されている。（±）
フタスジヒメハムシ	量：やや少ない	① 7月下旬の第1世代成虫の発生量は平年比やや少ない。（±～-）
アブラムシ類	量：並	① 7月下旬の発生量は平年並。（±） ② 向こう1か月の気温は平年比高く（+）、降水量はほ

		ぼ平年並と予想されている。(±)
【作物名】 病害虫名	予報内容 発生量：平年比 発生程度： 発生時期：平年比	予報の根拠

【大豆】(つづき)

ハダニ類	量：並	① 7月下旬の発生量は平年比やや少ない。(±~-) ② 向こう1か月の気温は平年比高く(+)、降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)
ウコンノメイガ	量：やや多い 時期：並	① 7月下旬の被害発生は平年比やや多い。(±~+) ② 向こう1か月の降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)
	【防除上の留意事項】 前年多発生した地域や大豆の生育が旺盛な場合は、多発生しやすいので注意する。	
ツメクサガ等 食葉性鱗翅目幼虫	量：並	① 7月下旬の被害程度は平年並、ツメクサガ等の寄生が確認される。(±)
マメシンクイガ	量：やや少ない	① 前年の発生量は平年比やや少なく、幼虫の越冬量はやや少ないと推定される。(±~-)
	【防除上の留意事項】 防除適期は8月第6半旬~9月第2半旬であるが、薬剤の種類により時期や回数に違いがあるので、最新の「防除指針」を参照する。	
カメムシ類	量：多い	① 予察灯等におけるクサギカメムシの誘殺数は平年比多い。(+) ② 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(+)

【なし】

黒斑病	量：やや少ない 程度：少発生 (発病葉率1~5%)	① 7月下旬の発生量は平年比やや少ない。(一) ② 向こう1か月の降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)
黒星病	量：並 程度：少発生 (発病葉率1~5%)	① 7月下旬の発生量は平年並。(±) ② 向こう1か月の気温は平年比高く(+)、降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)。
	【防除上の留意事項】 ① 発病葉、発病果は見つけ次第除去し、土中深く埋める等適切に処分する。 ② 徒長枝を整理して薬剤がよくかかるようにする。また、薬液のかかりにくい園地の周縁部は補正散布を行う。 ③ 気象予報に留意し、降雨前散布を励行するとともに、かけむらのないよう丁寧に散布する。 ④ 耐性菌の発生を抑制するため、作用機構の同じ薬剤の連用は避け、作用機構の異なる剤をローテーション使用する。 ⑤ 薬剤防除の際には、使用する薬剤の使用前日数等に十分注意する。 ⑥ 翌年に伝染源を持ち越さないように、秋期防除及び休眠期の落葉処理を実施する。	

【作物名】 病害虫名	予報内容 発生量：平年比 発生程度： 発生時期：平年比	予報の根拠
---------------	--------------------------------------	-------

【なし】つづき

褐色斑点病 (西洋なし)	量：やや少ない 程度：少発生 (発病葉率1～5%)	① 7月下旬の発生量は平年比やや少ない。(－) ② 向こう1か月の降水量はほぼ平年並と予想されている(±)
【防除上の留意事項】		
① 発病葉、発病果、発病枝は剪除し、園外に持ち出し適切に処分する。		
② 徒長枝を整理して薬剤がよくかかるようにする。また、二次伸長枝は発病しやすいので、適正に剪除し、適切に処分する。		
③ 気象予報に留意し、降雨前散布を励行するとともに、かけむらのないよう丁寧に散布する。また、薬液のかかりにくい園地の周縁部は補正散布を行う。		
ナシヒメシンクイ	量：やや多い 程度：少発生 (被害果率1～2%) 時期：並 (第2世代成虫の発蛾盛期は7月第4半旬～第6半旬ころ)	① 7月下旬のももの被害新梢の発生量は平年並。(±) ② フェロモントラップでの誘殺数は平年比やや多い。(＋) ③ 有袋栽培等の物理的防除の実施率が高い。(－) ④ 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(＋)
【防除上の留意事項】		
① 被害果を見つけた場合は、土中深く埋めるなど適切に処分し、成虫の発生を防ぐ。		
② 果実被害は収穫期が遅いものほど多くなる傾向があるので、中生～晩生品種(豊水、新高など)は特に注意する。		
ハマキムシ類	量：並～やや多い 程度：少発生 (被害葉率1～15%)	① 7月下旬の被害葉の発生量は平年並。(±) ② リンゴコカクモンハマキのフェロモントラップ誘殺数は平年並。(±) ③ 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(＋)
モモシンクイガ	量：やや多い 程度：少発生 (被害果率1～2%)	① 7月下旬の被害果は未確認。(±) ② フェロモントラップでの誘殺数は平年比やや多い。(＋) ③ 有袋栽培等の物理的防除実施率が高い。(－) ④ 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(＋)
果樹カメムシ類	量：やや多い 程度：少発生 (被害果率1～2%)	① 7月下旬の被害果は未確認。(±) ② 予察灯での誘殺数は平年比多い。(＋) ③ 有袋栽培等の物理的防除実施率が高い。(－) ④ 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(＋)

【作物名】 病害虫名	予報内容 発生量：平年比 発生程度： 発生時期：平年比	予報の根拠
---------------	--------------------------------------	-------

【なし】つづき

ハダニ類	量：やや多い 程度：少発生 (寄生葉率 1～15%)	① 7月下旬の寄生葉の発生量は平年並。(±) ② 向こう1か月の気温は平年比高く(+)、降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)
<p>【防除上の留意事項】</p> <p>① 徒長枝を整理して薬剤がよくかかるようにする。</p> <p>② ハダニ類は、薬剤抵抗性が発達しやすいため、同一殺ダニ剤の使用は原則として年1回とし、作用機構の異なる薬剤をローテーション使用する。</p> <p>③ 収穫時期に近い品種については、農薬の使用時期(収穫前日数)に注意する。</p>		

【もも】

せん孔細菌病	量：やや多い 葉の発生程度： 中発生 (発病葉率 11～30%) 果実の発生程度： 中発生 (発病果率 6～15%)	① 7月下旬の発病葉および発病果の発生量はともに平年比やや多い。(+) ② 向こう1か月の降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)
<p>【防除上の留意事項】</p> <p>① 新梢に発生する夏型枝病斑は見つけ次第剪除し、また、収穫残りのり病果は放置せず、摘除し、園外に持ち出し適切に処分する。</p> <p>② 発病が多い園地は、収穫後速やかに秋期防除(10月中旬まで)を実施し、次年度の越冬菌量を減少させる。</p>		
灰星病	量：並 程度：少発生 (発病果率 1～5%)	① 7月下旬の発病果の発生量は平年並。(±) ② 向こう1か月の降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)
<p>【防除上の留意事項】</p> <p>① 発病および腐敗果実は見つけ次第取り除き、土中深く埋める等適切に処分する。</p> <p>② 品種により収穫期が異なるので、薬剤防除にあたっては隣接園地への飛散に十分注意するとともに、農薬使用基準(収穫前日数)を遵守する。</p>		
モモハモグリガ	量：やや少ない 程度：少発生 (被害葉率 1～5%)	① 7月下旬の被害葉の発生量は平年比やや少ない。(－) ② フェロモントラップでの誘殺数は平年比やや少ない。(－) ③ 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(＋)

【作物名】 病害虫名	予報内容 発生量：平年比 発生程度： 発生時期：平年比	予報の根拠
---------------	--------------------------------------	-------

【もも】つづき

ナシヒメシンクイ	量：やや多い 程度：少発生 (被害果率1～2%)	① 7月下旬の被害新梢の発生量は平年並。(±) ② フェロモントラップでの誘殺数は平年比やや多い。(+) ③ 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(+)
モモシンクイガ	量：やや多い	① 7月下旬の被害果は未確認で、発生量は平年並。(±) ② フェロモントラップでの誘殺数は平年比やや多い。(+) ③ 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(+)
ハダニ類	量：並 程度：少発生 (寄生葉率1～15%)	① 7月下旬の発生量は平年比やや少ない。(－) ② 向こう1か月の気温は平年比高く(+)、降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)

【ぶどう】

晩腐病	量：やや多い 程度：少発生 (発病果房率1～10%)	① 7月下旬の発病果は未確認。(±) ② 主要感染期の6月下旬は降水量が平年比多いため感染量も平年比多いと推察される。(+) ③ 向こう1か月の降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)
べと病	量：多い 程度：少発生 (発病葉率1～10%)	① 7月下旬の発生量は平年比多い。(+) ② 向こう1か月の降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)
褐斑病	量：並 程度：少発生 (発病葉率1～10%)	① 7月下旬の発生量は平年並。(±) ② 向こう1か月の降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)
ベスタロチアつる枯病	量：並 程度：少発生 (発病果房率1～10%)	① 7月下旬の発病果は未確認。(±) ② 向こう1か月の降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)
フタテンヒメヨコバイ	量：並 程度：少発生 (被害葉率1～25%)	① 7月下旬の被害葉は未確認で、発生量は平年並。(±) ② 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(+)

【かき】

すす点病	量：並	① 7月下旬現在、発病果は未確認で、平年並。(±) ② 向こう1か月の降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)
チャノキイロアザミウマ	量：多い	① 7月下旬現在、被害果は平年比で多い。(+) ② 向こう1か月の気温は高いと予想されている。(+)
果樹カメムシ類	量：多い	① 7月下旬現在、被害果は未確認で、平年並。(±) ② 予察灯での誘殺数は多い。(+) ③ 向こう1か月の気温は高いと予想されている。(+)

【作物名】 病害虫名	予報内容 発生量：平年比 発生程度： 発生時期：平年比	予報の根拠
---------------	--------------------------------------	-------

【秋冬ねぎ】

さび病	量：やや少ない 程度：少発生 (発病度 1～5)	① 7月下旬の発生量は平年比やや少ない。(－) ② 向こう1か月の気温は平年比高く、降水量はほぼ平年並と予想されている。(±～－)
黒斑病・葉枯病	量：やや少ない 程度：少発生 (発病度 1～20)	① 7月下旬の発生量は平年比やや少ない。(－) ② 向こう1か月の降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)
軟腐病	量：やや多い 程度：少発生 (発病株率 1～5%)	① 7月下旬の発生量は平年並。(±) ② 向こう1か月の気温は平年比高く(+)、降水量はほぼ平年並と予想されている。(±)
ネギハモグリバエ	量：多い 程度：少発生 (被害度 1～10)	① 7月下旬の発生量は平年比やや多い。(＋) ② 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(＋)
ネギアザミウマ	量：やや多い 程度：多発生 (被害度 21～30)	① 7月下旬の発生量は平年比やや少ないが、多～甚発生ほ場も認められた。(±～＋) ② 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(＋)
<p>【防除上の留意事項】 盛夏期前から密度が急増するので発生状況に注意し、発生が多いほ場では、定期的に防除を行い、密度抑制に努める。</p>		
ネギコガ	量：並 程度：少発生 (被害株率 1～25%)	① 7月下旬の発生量は平年並。(±) ② 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(＋)
シロイチモジヨトウ	量：並 程度：少発生 (被害株率 1～5%)	① 7月下旬の発生量は平年並。(±) ② フェロモントラップの誘殺数は、平年並～やや少ない。(±～－) ③ 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(＋)

【その他】

【アブラナ科野菜】 コナガ	量：やや少ない	① フェロモントラップ誘殺数は、平年並～やや少ない。(±～－) ② 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(－)
【野菜類全般】 オオタバコガ	量：並～やや多い	① フェロモントラップ誘殺数は平年並～やや少ない。(±～－) ② 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(＋)
【全般】 ハスモンヨトウ	量：並	① フェロモントラップ誘殺数は平年並～やや少ない。(±～－) ② 向こう1か月の気温は平年比高いと予想されている。(＋)

～ 防除上の注意事項は、最新の「新潟県農作物病害虫雑草防除指針」を参照してください ～

注1：①「予報内容」の発生量は、予想される発生量が、新潟県における平年の発生量に比べて多
いか少ないかを、少、やや少、並、やや多、多の5段階で表記しています。

②発生程度は、予想される発生量が、国の調査実施基準等で定められている、無発生、少発
生、中発生、多発生、甚発生のいずれに該当するかを表記しています。

注2： 「予報の根拠」の、（+）は発生量を増加させる要因、（-）は発生量を減少させる要因、
（±）はどちらともいえない要因を示しています。

～ 農薬は適正に使用しましょう ～

【新潟県農薬危被害防止運動実施期間：6月1日～8月31日】

- 農薬の準備・使用にあたっては、必ず最新の農薬登録情報を確認しましょう。
- 使用に際しては、ラベルに記載の使用基準や注意事項をよく読み、使用者が責任を持って使いま
しょう。
- 農薬の飛散防止に努めましょう。周辺作物や住宅及びミツバチ等への危害防止のため、周辺の生
産者や住民、養蜂業者に事前に防除計画を通知するなどの対策をとりましょう。
- 農薬の使用後は防除日誌や作業日誌等の記帳に努めましょう。
- 水田で湛水して農薬を散布する場合は、処理後7日間の止水を厳守し、落水しないようにしまし
ょう。

新潟県病害虫防除所業務課

電 話：0258-35-0867

F A X：0258-35-7445

<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/bojo/>

【参考】北陸地方 1か月予報（8月1日から8月31日までの天候見通し）

（新潟地方気象台：令和2年7月30日発表）

＜予想される向こう1か月の天候＞

向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

向こう1か月の平均気温は、高い確率50%です。

週別の気温は、1週目は、平年並の確率50%です。

2週目は、高い確率50%です。

3～4週目は、高い確率50%です。

＜向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率（%）＞

	低い（少ない）	平年並	高い（多い）
気 温	20	30	50
降 水 量	40	30	30
日照時間	30	30	40

＜気温経過の各階級の確率（%）＞

	低い	平年並	高い
1週目（8月1日～8月7日）	30	50	20
2週目（8月8日～8月14日）	20	30	50
3～4週目（8月15日～8月28日）	20	30	50